

Élevage des oiseaux de basse-cour

Optimisez la performance et le bien-être de vos oiseaux, ce n'est pas si sorcier. Ça passe par une bonne gestion de l'environnement et de l'alimentation.

Préparez-vous à l'arrivée de vos oiseaux !

Démarrage (1 à 10 jours)

1 Nettoyez et désinfectez à fond l'enclos d'élevage, les murs, les plafonds et les équipements.

2 Aérez et asséchez le local.

3 Répandez de 5 à 10 cm (2 à 4 po) de litière sèche et propre sur le sol.

4 Vérifiez que tous les équipements d'alimentation, d'abreuvement, d'éclairage, de ventilation et de chauffage fonctionnent bien.

5 Allumez le chauffage au moins 24 à 48 h avant l'arrivée des oiseaux.

6 Installez des cartons de 30 cm (12 po) de hauteur autour des lampes chauffantes. Enlevez les cartons quand les oiseaux ont entre 7 et 10 jours.

Température

Prévoyez une lampe chauffante de 250 watts pour environ 75 poussins. Au jour 1, la température sous la lampe chauffante doit être à 35 °C (95 °F). Réduisez ensuite la température de 2 à 3 °C (5 °F) par semaine en ajustant la hauteur de la lampe pour atteindre 20 °C (68 °F) vers l'âge de 6 semaines.

Eau


L'eau doit toujours être propre, fraîche et tempérée. Un pot d'eau suffit pour environ 50 poussins. Vous pouvez aussi opter pour des abreuvoirs d'élevage.

Lumière

La première journée, nous recommandons un éclairage continu (24 h). Par la suite, les oiseaux ont besoin de 16 à 20 h de lumière par jour et d'au moins 4 h de noirceur.

Alimentation

Offrez de la moulée aux poussins dès leur arrivée. Ajoutez-en régulièrement en petites quantités dans les mangeoires à poussin.
Astuce : Étendez du papier épais sur la litière. Vous pourrez y déposer de la moulée pour inciter les poussins à manger durant les premiers jours. En plus, ça les empêche de consommer la litière !



Quelques produits essentiels à ne pas oublier


Pour ampoule en fibre de carbone




054-3903
12 po x 250 pi



001-5980
1 intensité
11 3/4 po



001-5981
1 intensité
15 3/4 po



001-5982
2 intensités
15 3/4 po

Ampoule en fibre de carbone

001-5983 600 W
001-5984 900 W
001-5985 1200 W
001-5986 1500 W

Pour ampoule à infrarouge



039-8385
Ripe de bois



001-3024
Ripe de papier



061-5167
1 intensité



061-7855
2 intensités

Ampoule à infrarouge

PAR38 175 W
061-8623 Pq't de 2
BR40 250 W
065-0902 Pq't de 2



079-8266
Solu-Mix



001-3761
Début de croissance



001-3762
Croissance-Finition



001-5958
Poule-Vite



063-5781
Contrôleur d'odeur


Plusieurs couleurs disponibles




001-6411
Jarre



001-6449x
Base d'abreuvoir 1 L



001-6416x
Base de mangeoire 1 kg



001-6520x
Mangeoire 20 po

Élevage des oiseaux de basse-cour

Optimisez la performance de vos oiseaux grâce à la moulée Agrizone !

Préparez-vous à l'arrivée de vos oiseaux !

Poules pondeuses

1

S'assurez que l'espace est nettoyé, désinfecté et asséché avant l'arrivée des oiseaux. Mettre suffisamment de litière.

2

Prévoyez assez de mangeoires pour que tous les oiseaux puissent s'alimenter simultanément et à volonté. Ajustez la hauteur des mangeoires pour qu'elles arrivent au milieu du dos des poulets.

3

Assurez-vous que les volailles vident les trémies une fois par jour. Nettoyez les trémies régulièrement.

4

Conservez les aliments dans un endroit sec et frais.

Température

En dehors de la période de démarrage, la température de confort des oiseaux se situe entre 19 et 21 °C (66 et 70 °F). Tout écart de température nuit au bien-être de vos animaux. Vous pouvez utiliser un système de chauffage pour contrer les variations.

Eau

Les oiseaux doivent avoir accès à de l'eau propre et fraîche en tout temps. Nettoyez les abreuvoirs régulièrement et ajustez la hauteur pour que les volailles puissent y accéder facilement.

Lumière

À partir de l'âge de 18 semaines, augmentez la période de luminosité de 30 minutes par semaine jusqu'à ce que vous atteigniez 16 h par jour. Nous recommandons d'utiliser une ampoule de 25 watts par 25 m² (270 pi²).

Litière

Il doit toujours y avoir de 5 à 10 cm (2 à 4 po) de litière sur le plancher. Enlevez la litière humide ou souillée et rajoutez-en au besoin.

Alimentation

Servir la moulée de ponte à raison de 100 à 120 g (3,5 à 4,2 oz) par jour par poule. Offrir en tout temps du gravier insoluble.



Simple de magasiner en ligne !

Paiement sécurisé
Livraison par colis gratuite
dès 49 \$ d'achat
Partenaires de livraison de confiance
Retours faciles en 30 jours

Quelques produits essentiels à ne pas oublier

Pour ampoule à infrarouge

Pour ampoule en fibre de carbone



061-5167
1 intensité



061-7855
2 intensités



001-5980
1 intensité
11 ¾ po



001-5981
1 intensité
15 ¾ po



001-5982
2 intensités
15 ¾ po



061-8623
PAR38 175 W
Pqt de 2



065-0902
BR40 250 W
Pqt de 2



Ampoule en
fibre de
carbone



**Ampoule en fibre
de carbone**
001-5983 600 W
001-5984 900 W
001-5985 1200 W
001-5986 1500 W



039-8385
Ripe de bois



001-3024
Ripe de papier



063-5781
Contrôleur
d'odeur



063-5790
Bain de
poussière



001-3663
Terre de
diatomée



079-8266
Solu-Mix



001-3760
Moulée de
ponte



001-4534
Gravier
insoluble



001-5958
Poule-Vite



079-4604x
Gâteries de
larves séchées



080-2480x
Abreuvoir



080-2453x
Mangeoire



001-7658
Abreuvoir



001-7659
Mangeoire



001-9434x
Bloc à picorer

Moteur et porte pour poulailler



001-7654
Poulailler



018-2304x
Crillage à
volaille



001-2734
Moteur pour
porte



001-2735
Porte
coulissante



Pour plus d'informations sur les produits,
consultez le www.bmr.ca